

Aluneb®

HIPERTÓNICO

PR021915/0619

Aluneb® Hipertónico es una solución salina hipertónica al 3% para la nebulización nasal, a base de ácido hialurónico de alto peso molecular y xilitol, con acción descongestiva y fluidificante sobre las mucosas nasales. Indicado especialmente para la limpieza de las fosas nasales, sobre todo en caso de resfriado, rinitis y rinitis alérgica, sinusitis, otitis y todos los estados congestivos de las mucosas nasales.

El **ácido hialurónico** nebulizado hidrata y facilita la eliminación del moco y los alérgenos de las vías respiratorias superiores. Puede ser útil en la regulación del aclaramiento mucociliar, aliviando todos los síntomas ligados a factores inflamatorios, alérgicos y ambientales. Crea una capa protectora e hidratante con efecto barrera. Ayuda a la cicatrización postquirúrgica de la mucosa nasal. Reduce la capacidad de adhesión bacteriana. El **Xilitol** ayuda a fluidificar el moco. Reduce la capacidad de adhesión bacteriana. Ayuda a reducir los episodios de otitis media, rinitis y sinusitis.

Indicaciones:

- Coadyuvante en el tratamiento de la amigdalitis, laringitis, faringitis, rinitis, sinusitis y otitis.
- Libera la nariz del moco, favoreciendo la eliminación de las excesivas secreciones nasales.
- Afecciones rinofaríngeas caracterizadas por congestión y alteración del aclaramiento mucociliar.
- En el postoperatorio de cirugía nasal.
- Hidrata las vías respiratorias y estimula el aclaramiento mucociliar.
- Facilita la respiración, la alimentación y el sueño de los lactantes.
- En aerosolterapia, puede ser utilizado como coadyuvante en el tratamiento de la bronquiolitis.
- En aerosolterapia puede ser utilizado para diluir medicamentos.

Composición de un vial: cloruro de sodio, hialuronato de sodio, xilitol, fosfato potásico monobásico, fosfato potásico dibásico, agua de mar y agua.

Modos de Uso:

Las soluciones Aluneb® pueden ser utilizadas para nebulizar en aerosolterapia, ducha nasal o mediante el Dispositivo de Nebulización Nasal Aluneb®.

Posología:

Uso con dispositivo de nebulización o ducha nasal:

Niños hasta 6 años: Según necesidad, de 1 a 2 viales, 1 ó 2 veces al día.

Niños de más de 6 años y adultos: Según necesidad, de 1 a 2 viales, 2 ó 3 veces al día.

Reparta el contenido del vial entre las dos fosas nasales.

Lactantes: Aplicar directamente algunas gotas en la nariz.

Se recomienda realizar los lavados preferiblemente al levantarse, antes de las comidas y antes de acostarse.

Uso en aerosolterapia:

Siga los consejos indicados por su médico. De forma general 1 ó 2 viales/2-3 veces al día. No utilizar en aparatos de ultrasonidos.

Modo de empleo:

1. Lavarse las manos antes y después de la aplicación.
2. Mover el vial monodosis en direcciones opuestas y separarla de la tira a la que está adherida.
3. Abrir el vial monodosis girando las aletas.
4. Depositar el contenido del vial en el recipiente de nebulizador o aspirar en la jeringa del Dispositivo de Nebulización Nasal MAD Nasal™ siguiendo las instrucciones del dispositivo.

Frecuencia de uso: la duración del uso depende de la evolución de los síntomas.

Si es necesario puede administrarse por un período prolongado.

Embarazo y lactancia: la seguridad del uso de Aluneb® hipertónico solución para nebulización durante el embarazo y la lactancia no ha sido establecida. Bajo dichas circunstancias, se aconseja consultar con el médico.

Advertencias: mantener fuera del alcance y la vista de los niños. Evitar el contacto con los ojos. No ingerir. Conservar el embalaje bien cerrado en un lugar seco, al abrigo de la luz. No utilizar el producto si el embalaje no está cerrado. No utilizar el producto después de la fecha de caducidad. La fecha de caducidad se indica en el embalaje y en cada vial monodosis. No superar la dosis aconsejada sin la opinión del médico. El uso, especialmente si es prolongado, de cualquier producto de uso tópico, puede dar lugar a fenómenos de sensibilización. Si se diera el caso, interrumpir el tratamiento y consultar con el médico a fin de establecer la terapia idónea. Si se produjeran efectos adversos descritos o no en el presente prospecto informativo, informar al médico o al farmacéutico. En niños de menos de un año, y en caso de asma bronquial, suministrar bajo tutela del médico. Si se están utilizando simultáneamente otros productos, verificar las interacciones. Después del uso, eliminar las ampollas incluso si contienen residuos del producto: la eventual reutilización podría causar infección al paciente. No debe utilizarse en caso de hipersensibilidad o alergia demostrada hacia alguno de los componentes u otras sustancias químicas relacionadas.

Indicado para bebés, niños y adultos.

No contiene conservantes.

Contenido del embalaje:

- 20 viales de 5 ml de Aluneb® Hipertónico.

Distribuido por:
LABORATORIOS CINFA, S.A.
Olaz-Chipi, 10 P.I. Areta
31620 Huarte (Navarra)
ESPAÑA



Sakura Italia Srl
Via M. Cerutti, 90/c
25017 Lonato dal Garda (BS), Italia
www.sakuraitalia.it

Rev.04_11/2018

